



Spikkelspanners (1)



De genera Hypomecis en Peribatodes



Spikkelspanners vormen een lastige soortgroep van middelgrote tot grote, vaak grijsachtige soorten die slechts door details van elkaar verschillen. Eens je weet welke details tellen, wordt de determinatie echter veel minder onoverkomelijk. Twee soorten kunnen in Vlaanderen als zeer algemeen beschouwd worden: Taxusspikkelspanner en Gewone spikkelspanner, die beide in twee generaties vliegen.

1. **Taxusspikkelspanner:** een grijze spanner met (soms onduidelijke) gekartelde dwarslijnen (foto rechtsboven). De buitenste dwarslijn maakt een opvallende knik nabij de voorrand. Onderzijde voorvleugelpunt met donker omrande lichte top (zie inzet links). Vliegt in mei-juli en in augustus-oktober.
2. **Geveerde spikkelspanner** maakt een bontere indruk en is minder grijs (foto rechtsonder) . Nabij de binnenrand van de voorvleugel komt de buitenste dwarslijn (nagenoeg) samen met een andere, wat resulteert in een opvallende zwarte vlek (die doorgaans minder opvalt of afwezig is bij Taxus-). Onderzijde voorvleugelpunt zonder sterk contrast.







3. **Ringspikkelspanner:** Het beste kenmerk van deze soort zit hem in zijn naam: het ringetje, dat stevast aanwezig is op de achtervleugel. Soms is ook op de voorvleugel een ringetje te zien. Let er voor op dat het ringetje soms slecht of onzichtbaar is, indien de voorvleugel te ver over de achtervleugel is geschoven. Verder is de Ringspikkelspanner een vrij grote (groter dan de Peribatodes-soorten), grijze soort. Het mannetje heeft duidelijk geveerde antennes. De dwarslijnen zijn, in tegenstelling tot bij Taxusspikkelspanner, vaak onduidelijk en tot pijlachtige puntjes gereduceerd. De golflijn is vaak duidelijker dan de buitenste dwarslijn. De onderzijde is nagenoeg egaal: enkel de ringetjes zijn langs ook zichtbaar, op zijn minst als donkere stippen.
4. **Grote spikkelspanner.** Ook deze soort heeft een goede naam: zonder meer is dit de grootste onder de spikkelspanners, al is er overlap met Ringspikkelspanner. Op de achtervleugel is een donkere stip aanwezig, maar geen ringetje. Op de achtervleugel is vaak een gekartelde dwarslijn zichtbaar, terwijl de voorvleugels vaag getekend zijn. De onderzijde is sterk getekend, vooral langs de voorrand van de voorvleugel en in de voorvleugelpunt. Vliegt in juni-juli.
In vergelijking met Taxusspikkelspanner zijn de dwarslijnen onduidelijker (soms met vage knik nabij buitenrand), ontbreekt de zwarte vage vlek nabij de 'middenstip' & zijn de antennes iets minder sterk geveerd.



Taxusspikkelspanner
Peribatodes rhomboidaria



Grote spikkelspanner
Hypomecis roboraria



Ringspikkelspanner
Hypomecis punctinalis



Grote spikkelspanner
Hypomecis roboraria

