

Clef des Cigales d'Auvergne / Limousin

A- grandes espèces, taille du corps de 25 à 38 mm, ailes de 7 à 10 cm d'envergure

☐ ailes antérieures sans aucune tache sombre, nervures des ailes colorées +/- de orangé à rouge

■ grande espèce de 30-40 mm avec ailes à nervation jaune à la base, sutures des éléments abdominaux non surlignés de jaune ou rouge, pronotum noir liseré de gris. *Stridulation* puissante éraillée entrecoupée de stridulation de fréquence plus rapide [Cigale plébeienne – *Lyristes plebejus*](#)



■ espèce moyenne de 25-35 mm avec ailes à nervation presque entièrement rouge orangé, sutures des éléments abdominaux lignées de rouge orangé, pronotum noir liseré de rouge orangé ; *Stridulation* commençant par 2-3 notes détachées suivies d'une longue stridulation égale [Cigale rouge – *Tibicina hamaetodes*](#)

☐ ailes antérieures présentant une série de 11 taches noires, nervures jaune à la base, sutures des éléments abdominaux surligné de jaune, pronotum bariolé de jaunâtre et gris, taille 25-35 mm ; *stridulation* typiquement saccadée [Cigale grise – *Cicada orni*](#)



B- petites espèces inférieures à 20 mm


☐ les nervures médiane et cubitale de l'aile antérieure forme un tronc commun à l'angle de la cellule basale ; espèces de 13 à 18 mm



■ minuscule espèce ne dépassant pas les 13mm, très sombre, abdomen à éléments très finement cerclés de jaune, pronotum avec 2 petites taches jaunes triangulaires tête sombre avec petites marques jaunes peu nombreuses et peu visibles, nervures des ailes sombres ; *stridulation* répétitive de strophes courtes (ressemble à une stridulation de criquet) [Cigale pygmée – *Tettigettula pygmae*](#)

■ petite espèce d'environ 17-18mm, sombre mais à éléments de l'abdomen fortement cerclé d'orangé, pronotum marqué de 2 taches orangées importantes, souvent fusionnées en forme de W, nervures des ailes jaune orangé ; *stridulation* à strophes saccadées courtes entrecoupées d'une note isolée [Cigale argentée – *Tettigettalma argentata*](#)

□ les nervures médiane et cubitale de l'aile antérieure partent séparément de l'angle de la cellule basale ; espèces de 17 à 18 mm **quasiment inséparables de visu, stridulations diagnostiques**



nervures colorées de jaune orangé, pronotum sombre sans taches, tête sombre quasi sans taches, abdomen à éléments cerclés de jaune

- stridulation faite de strophes d'environ 5 secondes terminées par un tsic isolé Cigale des collines – Cicadetta brevipennis
- stridulation longue de 30 à 50 secondes, uniforme sans tsic isolé Cigale des montagnes – Cicadetta montana

photos tirées du site [ARAMEL](#), liens stridulations vers le site [CICADASONG](#),
rédaction et schémas Pascal Duboc